

Aptamil AR Andickungsmittel


- Zum Diätmanagement bei Aufstossen und Spucken von Geburt an
- Zum Andicken der gewohnten Milch
- Mit Johannisbrotkernmehl

Standardauflösung		Im Schoppen: 1.7 g Aptamil AR Andickungsmittel + 100 ml Mutter- oder Säuglingsmilch.	
Nährwertanalyse		für 1 Dosierlöffel mit 1.7 g Pulver	pro 100 g Pulver
Energie			
Fett			
	gesättigte Fettsäuren		
Kohlenhydrate			
	davon Zucker		
	Lactose		
	Glucose		
	Maltose		
	Polysaccharide		
Nahrungsfasern			
Eiweiss			
Salz*			
Vitamine			
Mineralstoffe	Natrium**		
	Kalium**		
	Chlorid**		
	Calcium		
	Phosphor**		
	Magnesium**		
	Eisen		
	Zink		
	Kupfer**		
	Mangan**		
Osmolarität	(mOsmol/l)		
Renale Molenlast	(mOsmol/l)		

Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.

* Ohne Salzzusatz, da von Natur aus Natrium enthalten.
 ** Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen.

Nur von Aptamil: Auch zum Andicken der Muttermilch



Definition	Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke für die speziellen Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen bei Aufstossen und Spucken, zur Andickung der gewohnten Milch des Babys.								
Indikationen	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Andickung von Muttermilch oder der gewohnten Säuglingsmilch. • Von Geburt an. • Ohne Gluten/Lactose/Soja. • Nur unter medizinischer Kontrolle verwenden 								
Kontra-Indikationen	<ul style="list-style-type: none"> • Aptamil AR Andickungsmittel ist nicht für Frühgeborene oder Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht geeignet (<1800 g). • Aptamil AR Andickungsmittel eignet sich nicht als alleinige Nahrung. • Verwenden Sie Aptamil AR Andickungsmittel nicht mit einer bereits angedickten AR-Milch oder einer Milch für Verdauungsprobleme. • Nach Absprache mit dem Arzt. Allergene: –								
Zutaten	Maltodextrin, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl (0.5 g/100 ml), Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat.								
Eigenschaften	Johanniskernmehl <ul style="list-style-type: none"> • Besteht hauptsächlich aus hydrokolloidalen Polysacchariden mit hohem Molekulargewicht (bestehend aus Galactose- und Mannose-Einheiten) und unverdaulichen Nahrungsfasern. • Durch diese Zugabe wird die Viskosität der Flüssigkeit erhöht. Im Gegensatz zu Stärke wird Johanniskernmehl nicht von der Speichel-Amylase verdaut. Die Viskosität bleibt im Magen erhalten und verhindert einen Rückfluss in die Speiseröhre.²⁰ Nährstoffrelation (in % der Gesamtenergie) <ul style="list-style-type: none"> • Eiweiss:Fett:Kohlenhydrate: Nahrungsfasern = 0:1:83:16. 								
Zubereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnehmen im Schoppen: Hände waschen. Sauger und Schoppen auskochen. Pumpen Sie die Muttermilch ab oder bereiten Sie die gewohnte Milch gemäss den Zubereitungshinweisen des Herstellers zu (lassen Sie sie idealerweise auf 40° C abkühlen). Geben Sie Aptamil AR Andickungsmittel gemäss der unten stehenden Dosierungstabelle hinzu. Rollen Sie den Schoppen zwischen den Händen (5 Sek.) und schütteln Sie ihn anschliessend gut (20 Sek.). Dann 7 Minuten stehen lassen (damit die Milch andicken kann). Schoppen kurz auf den Kopf drehen, dann bitte sofort füttern.** • Essen mit dem Löffel: Diese Methode kann bei gestillten Babys oder bei Babys, die schon Beikost erhalten, angewendet werden. Fügen Sie Aptamil AR Andickungsmittel gemäss der unten stehenden Dosierungstabelle zur gewohnten Milch oder abgekochtem Wasser hinzu. Verrühren Sie beides und lassen Sie die Paste 3 Minuten zum Andicken stehen. Nochmals verrühren und dann mit einem Löffel vor oder während der Mahlzeit füttern. ** Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.								
Dosierung	Die nachfolgende Tabelle gibt die Dosierungen zur Herstellung je einer Schoppenmahlzeit an: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Menge für das Aufnehmen im Schoppen Messlöffel</th> <th>Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser (ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> Die nachfolgende Tabelle gibt die Dosierungen zum Essen mit dem Löffel an: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Menge für das Essen mit dem Löffel Messlöffel</th> <th>Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser (ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> Der beigelegte Messlöffel fasst gestrichen voll ca. 1.7g Aptamil AR Andickungsmittel.	Menge für das Aufnehmen im Schoppen Messlöffel	Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser (ml)	1	100	Menge für das Essen mit dem Löffel Messlöffel	Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser (ml)	1	25
Menge für das Aufnehmen im Schoppen Messlöffel	Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser (ml)								
1	100								
Menge für das Essen mit dem Löffel Messlöffel	Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch oder abgekochtes Wasser (ml)								
1	25								
Packung	135 g (nur in Apotheken/Drogerien).								